

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
普濟方卷二十二

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣鮑之鍾

謄錄監生臣沈世玖

欽定四庫全書

普濟方卷二十二

明

周王朱橚撰

脾臟門

並理脾胃

夫人身之脾胃專藉之以容納五穀而尅化之脾屬土而居五臟之中寄旺於四時之內以土能容載萬物故好靜其脉常喜沉細而緩帶浮緊洪數者即有病之脉也尋常理脾助胃之道當用以和平之藥又須時其饑

飽不以生冷之物傷之不為寒暑所侵不為七情所傷
如是則氣體自然充實百病不生將理失宜或為六淫
七情相干為嘔為泄為滿為喘變生諸症矣

方

綾錦養脾丸

出御藥院方

治大補脾胃極進飲食調順三

焦保養榮衛脾腎俱虛冷氣攻刺心胸脇小肚疼痛
嘔逆痰水口苦噫氣吞酸及膀胱冷氣逆衝腰背臍
腹絞痛手足微冷小便頻數又治卒暴心疼霍亂吐

痢婦人血氣癥瘕心腹刺痛此藥誠如綾錦之美麗
故以名

木香 丁香 沉香 紅豆 大椒 官桂

去粗皮

附子 炮製去皮臍各一錢 白茯苓 去皮 內豆蔻 川薑 炮製 革

撥 革澄茄 縮砂仁 甘草 剉炙 人參 去蘆頭 白

朮 訶子肉 陳皮 去白 神麴 打碎微炒 良薑 剉炒 麥蘖 炒

各二錢半 厚朴 去粗皮生薑製 破故紙 微炒上二味各六錢

右為細末煉蜜和丸每兩作六丸此藥雖有三五味

辛熱煉蜜和成約四兩半藥并煉淨熟蜜約四兩半
計九兩分作五十四丸一錢六分有餘若服此藥一
料大補如前法每服一九細嚼好酒或薑湯米湯沸
湯送下不拘時候

沉香溫胃丸

出御藥院方

治脾胃虛弱三焦痞塞中脘氣

滯胃膈滿悶宿寒留飲停積不消心腹刺痛脇肋膨
脹嘔吐痰逆噫氣吞酸腸鳴泄痢水穀不化肢體倦
怠不思飲食常服可益脾胃大進飲食溫中消滯寬

膈順氣

沉香

剉

陳皮

去白

青皮

去白

人參

去蘆頭

大麥蘖

炒

乾薑

炮神麴

炒

白茯苓

桂

並去粗皮

甘草

炙各一兩

揀丁香

高良薑

剉

丁香皮

白豆蔻仁

革撥

縮砂仁

紅豆

各半兩

白朮

剉炒

大椒

二錢半

嚼生薑湯送下

右為細末煉蜜和丸每兩作十丸每服一丸食前細

和胃丸

出和劑方

治脾胃不和中脘氣痞心腹脹悶不思

飲食嘔吐痰逆噫氣吞酸面色萎黃肌肉消瘦腹脇刺痛便利不調少力及嗜卧體重骨節痛及治虛勞脾胃虛弱飲食不化心腹痞滿並宜常服此藥老幼氣弱皆可常服能溫中和脾胃進調飲食

厚朴

去粗皮碎以生薑二兩研爛同炒

半夏

一半湯洗日乾微炒一半生薑汁製作餅

多神麴

碎炒

鯮甲

揀用大者一枚黃泥外裹以米醋二碗化硃砂一兩放鯮甲內漫火

熟乾取二兩細研如粉用

麥蘗

微炒

白朮

剉炒

肉桂

去粗皮各二兩

枳殼

去瓢

麴炒

三稜

炮

青皮

去白炒

人參

各三兩

陳皮

去白

訶子

炮

各核

四
兩 檳榔 當歸 各一
兩半 芍藥 甘草 炒各
一兩 甘薑 炮赤

茯苓 去皮各
三分

右為細末蜜丸小豆大每服十二丸微嚼破溫水下
不計時候

大健脾丸 出醫方
大成

調中養氣和胃健脾治中焦積寒

胃膈氣痞嘔逆惡心腹脇疼臟腑虛滑飲食多傷困
倦少力肢體怠惰少精神

肉桂 去粗皮
剉用

厚朴 去粗皮細剉用生薑一兩
研爛同浸一宿炒令香熟

甘草

各一兩炙
肉豆蔻麵裹煨
乾薑炮
丁香
胡椒
附子炮去

皮臍
木香
革撥
神麴炒
白朮
麥蘗炒
人參去蘆

白茯苓去皮
白豆蔻各半
訶子麵裹煨去核二錢半

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼溫米

飲下食前

吳茱萸丸一名木香利膈丸
大理脾胃胸膈不通調中順氣方

治冬三月陰氣在外陽氣內藏當外助陽氣不得發汗內消陰火勿令泄瀉此閉藏周密之大要也盛冬

乃水旺之時水旺則金旺子能令母實肺者腎之母
皮毛之陽元本虛弱更以冬月助其令故病者善嚏
鼻流清涕寒甚出濁涕嚏不止比常人大惡風寒小
便數而短或上飲下便色清而多大便不調夜寒無
寐甚則為痰咳為嘔為噦為吐為嘔白沫以至口開
目瞪氣不交通欲絕者主之

吳茱萸

草豆蔻仁

各一錢
二分

橘皮

益智仁

人

參

黃耆

升麻

各八分

澤瀉

白僵蠶

薑黃

柴胡

各四分

當歸身

甘草

炙各六分

木香

二分

青皮

三分

麥蘖

一錢五分

半夏

一錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如菉豆大細嚼三十九白湯下無時夏三月暑陽氣在外陰氣在內以此病而值此時是天助正氣而剋其邪氣不治而自愈矣然亦有當愈不愈者蓋陰氣極盛正氣不能伸故耳且如膈咽不通咽中如梗甚者前證作治法當從時利膈丸泄肺火以黃耆補中湯送下如兩足痿蹶行步

惟艱敵側欲倒臂孺如折及作痛而無力或氣短氣促而喘或不足以息以黃耆人參甘草白朮蒼朮澤瀉猪苓茯苓橘皮等作湯送下滋腎一百五十九六七月之間濕熱之令大行氣短不能言者加五味子麥門冬如心下痞膨脹悶食不下以上件白朮蒼朮等湯送下消痞丸五十七九

溫脾散

出醫方大成

青皮 陳皮 縮砂仁 舶上茴香炒 桔梗 白芷

厚朴

各一兩

木香

香附子

白朮

各半兩

甘草

一兩五錢

紅豆

三分

良薑

一兩

麥蘗

五錢

乾葛

一兩

右咬咀每服三錢水一盞半棗一枚煎七分空心服

導氣枳殼丸

德生堂方

理順三焦調理脾胃去脹滿及痞

悶不通氣不舒暢

枳殼

炒

木通

青皮

炒

陳皮

炒

桑白皮

三稜

炒

莪朮

炒

檳榔

麥蘗

炒

神麴

炒

黑牽牛

小茴香

西木香

各五錢

右為細末蘿蔔熬水煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸溫水下無時

木香分氣丸

出濟生
拔萃方

善治脾胃不和心腹脹滿兩脇

膨脹胃膈注悶痰嗽喘息醋心乾嘔咽喉不利飲食不化並皆治之大有效

木香 檳榔

青皮

去白陳皮

去白

薑黃

玄胡

蓬莪朮

炮

乾生薑

當歸

白朮

赤茯苓

去皮肉

豆豉

枳殼

荆三稜

濕紙裏煨香

秋冬加丁香

炒各等分

右為細末白麵糊丸如小豆大每服三十五丸生薑湯下忌生茹馬齒一方無枳殼陳皮

大藿香散

出百一選方

大治一切心肺脾胃氣變為萬病

服之皆愈

盛季文傳於賀方回云前在河朔因食羊

肝傷脾胃泄瀉膿血仍發脾氣嘔吐霍亂心腹撮痛時出冷汗四肢厥逆不可忍

藿香葉

二兩

木香

青皮

去穢麩炒

神麩

炒

人參

去蘆

肉豆

寇

麵裹煨

良薑

炒

大麥蘗

炒

訶子

煨去核

白茯苓

甘

草

炒

厚朴

薑汁製炒

陳皮

各一兩去白

白乾薑

五錢炮

右為細末每服二錢吐逆瀉痢不下食或嘔酸苦水
翻胃惡心並用水一盞煨生薑半塊擘破同煎鹽一
捻安盞中候煎藥及七分熱呷水瀉滑洩腸風臟毒
陳米飲熱調入鹽少許下赤白痢煎甘草黑豆湯下
脾元受虛邪變為寒熱或脾胃虛冷醋心氣脹宿滯
酒食噫滿不化膈上不快面色積黑痰氣作暈頭目
眩掉水一盞薑三片棗一枚擘破同煎至七分入鹽
少許嚼薑棗湯熱服胃氣逆噫生薑自然汁半茶鍾

入鹽點熱呷絕不思食或喫少氣弱膈滿煨薑一小塊先嚼入鹽點熱服中酒亦如之或氣膈變成百病如上服之不拘時如湯點入薑鹽紫蘇尤佳大能消食順氣利膈開胃功不可細述

又方

出百一選方

主脾氣不調有寒熱或下閉塞調五臟

不利嘔逆飲食者

大黃

六分

杏仁

去皮

附子

炮

當歸

乾薑

桂心

各四分

人參

細辛

芍藥

茯苓

半夏

洗

黃芩

蜀

椒

各三分
炒出汗

玄參

五

右搗篩蜜和丸如梧桐子大飲服六九日三增至十

丸忌猪羊肉冷水麵生葱生菜酢物等一方無半夏

附子

育氣湯

出御藥
院方

通流百脉調暢脾元補中脘益氣海

思進飲食大益脾虛疼痛祛寒止腸鳴

白朮 丁香 人參 木香 白茯苓 藿香

縮砂仁 肉豆蔻 萆澄茄 甘草 乾山藥

各五錢

九

一陳皮去白青皮各一分

右為細末每服三錢木瓜湯空心點服鹽湯亦可一

方加白檀香五錢

瀉脾丸 調中利飲食除胃中積聚寒熱老人長服長

肌肉令人光澤

黃芩 杏仁去皮尖澤瀉 通草 芎藭 桂心

白朮 乾薑各五分茯苓 黃耆 乾地黄各六分附

子二分麥門冬四分

去心

右搗篩蜜和丸如桐子大每服二九日三服忌猪肉冷水桃李雀肉生葱酢物蕪荑等

白朮沉香散

出百一選方

墜氣益脾胃

沉香人參

紫暈者

白茯苓半夏麴訶子肉

木香川薑

各一兩

白朮乾山藥

各一兩五錢

甘草

六錢

丁香

五錢附子

兩箇炮

右為細末每服二錢水一中盞生薑三片棗一枚木瓜一片煎至七分食前服

桂麴丸

出醫方集成

健脾胃進飲食助尅化生冷溫中下

氣治食少易傷胸滿惡心或心腹疼痛病後衰弱氣

不復常

人參 草撥 白朮 乾薑炮 高良薑微炒 縮砂仁

肉豆蔻

麴裏煨

陳皮

湯浸去白

桂枝

各一兩去粗皮

甘草

剉炒

丁香

各五錢

神麴

三兩剉煨炒熟

右為末熟湯泡蒸餅和丸如梧桐子大食前一時米飲下五十丸以至七十丸

豈尅橘紅散

出醫方集成

溫脾胃升降陰陽和三焦化

宿食

丁香 木香

各一兩

白豆蔻仁 人參

去蘆

厚朴薑製 神

麴

炒

乾薑炮

半夏麴

炒

橘紅去白

甘草

炙

藿香葉

白朮

各五錢

右咬咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分溫服

和中益氣丸

出御藥院方

治脾胃不和氣不升降嘔吐減

食口苦吞酸胸滿短氣肢體怠惰面色萎黃中焦虛

痞不任攻擊藏氣久寒不受峻補又療心胸怫懣如
滿五飲停滯不散常服溫中益氣進美飲食或大便
不通尤宜服之

木香 丁香

各五錢

肉豆蔻

茴香

微炒

荊三稜

炮

白豆蔻仁

人參

去蘆頭

桂

各一兩
去粗皮

縮砂仁

二兩

青皮

去陳皮

各四兩
去白

右為細末白麵糊和丸如桐子大每服六十九至七
十九食前溫生薑湯下

通膈丸

出醫方集成

快氣進食利胸膈消膨脹

丁皮

革澄茄

白豆蔻

檀香

粉草

各五錢

縮

砂仁

香附子

各一兩

木香

二錢

片子薑黃

二兩

甘松

丁香

各三錢

右為末用革澄茄為母以布蘸水塗濕筐盤一邊滾
革澄茄就乾筐盤一邊上藥末又滾就濕處一邊拌
濕再就乾處一邊上藥末即法丸也丸如梧桐子大
每服三十丸白湯送下

官方七香丸

出直指方

治消食快膈和胃止痛

木香 丁香 檀香 甘松淨 丁皮 橘紅 縮

砂仁 白豆蔻仁 三稜醋炙 蓬朮各五錢 醋炙 焙乾 大香

附

二兩五錢 炒去毛

右為末研米和丸如菜豆大每服三四十丸薑湯下
一方用油餅湯泡和丸

木香散中湯 治脾胃進飲食寬膈順氣

人參 白朮 茯苓 甘草 半夏 枳殼 香

附 縮砂 白豆蔻 木香 陳皮 各等分

右如法修製為吹咀每服六錢水一盞半生薑七片
棗一枚同煎至八分去滓溫服

木香枳殼丸 治寬胃膈進飲食消食快氣

木香 檳榔 陳皮 去白 黃連 去鬚 廣茂 煨 當歸 去蘆 枳

殼 去穢 青皮 已上各五錢 黃蘗 香附子 各一兩五錢 去毛 麩炒

牽牛 頭末 二兩

右為細末滴水為丸如桐子大每服五六十丸食後

薑湯送下若有瘡毒急服百丸至二百丸看人虛實
加減服但利五七行立消毒腫

丁香和胃丸 治脾胃不和中脘氣痞胸膈停痰嘔吐惡
心脇肋刺痛飲食無味肢體倦怠常服溫中和胃止
嘔進食

丁香 木香 沉香 各五錢 藿香葉 白茯苓 去皮 白

豆蔻仁 陳皮 去白 白朮 去白 人參 各一兩 半夏 三兩 薑製

右為細末生薑汁麵糊為丸如桐子大每服三十九

至五十丸煎生薑湯下不拘時候

大七香丸 治脾胃不和三焦滯氣不宣通腹脇脹滿

胸膈噎塞飲食遲化氣刺氣疰中酒吐酒常服消穀

進食

方見胃脘門
胃虛冷類

穀神丸 治消食健脾益氣進美飲食

人參 縮砂 香附子 炒去毛 三稜 炒 莪朮 煨 青皮

陳皮 神麴 炒 麥芽 炒 枳殼 炒去穰各等分

右為細末粳米糊丸如桐子大每服三十九空心米

飲吞下鹽湯下亦可

足齋安中湯 治脾胃一切疾不利

三稜

炮

義木

炮

川薑

炮

良薑

炮

陳皮

連白

草薢仁

益智仁

甘草

各一兩一分炙

神麴

炒

麥蘖

各三分炒

右為細末每服二錢食後鹽湯點服

大葷澄茄丸

和脾胃進美飲食治脾胃虛滿消積滯

化痰飲宜服

葷澄茄

一兩

青皮

去白

廣茂

煨

陳皮

去白

川丁皮

半夏

洗七
次

厚朴

各二兩五錢
去粗皮用薑製

赤茯苓

去皮
四兩

麥蘖

三兩

炒

右為末生薑汁麵糊為丸如桐子大每服六七十丸

溫生薑湯送下不拘時候

白朮湯

治理脾和胃順氣進食

白朮

厚朴

桂心

乾薑

桔梗

人參

當

歸

茯苓

甘草

各等分

右咬咀每服四錢水一盞棗二枚煎至八分去滓溫

服不拘時候

茯苓分氣散 治脾胃不和胸膈噎塞腹脇疼痛小腹
氣促喘急下脹滿飲食不進嘔吐不止兼脾氣橫泄
四肢浮腫

五味子 桔梗 白茯苓 桑白皮 蘇葉 大
腹皮 甘草 草蓂仁 陳皮 各一錢
五分

右吹咀每服四錢水一盞薑三片鹽少許煎至七分
空心服

思食丸

御藥院方

生津大進飲食

烏梅肉

大麥蘖

神麴

各一兩
碎炒

乾木瓜

桂

去粗皮

右為細末煉蜜為丸每兩作十丸每服一丸細嚼白湯下不拘時候日三服或作小丸如桐子大每服三十丸亦可

八珍湯

出醫方集成

和氣理脾胃

當歸

赤芍藥

川芎

熟地黃

人參

白朮

苓

甘草

砂仁

各等分

右吹咀每服三錢水一盞薑七片棗三枚同煎空心服

千金大思食丸

一名透氣丹
出百一選方

快氣進食

烏梅

去仁不
去核

神麴

各十
兩炒

蒼朮

四
兩

麥蘖

十五
兩炒

乾薑

炮

京三稜

陳皮

各二兩
去白

蓬莪朮

三
兩

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三五十丸橘

皮薑湯送下

治脾胃氣弱則所食之物不能腐又與穀相兼宿滯腹

內噫氣胸腹脹悶脇肋刺痛此藥寬利胸膈消化宿食

木香

桂皮

青皮

陳皮

各五錢

荆三稜

煨蓬

莪朮

各三兩

大麥蘖

檳榔

各一兩

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三五十九食

後生薑湯下

出御藥院方

木香三稜湯

出御藥院方

和脾胃進飲食消化生冷物治

心腹刺痛霍亂吐瀉胸膈膨脹

木香

神麴

各一兩

陳皮

湯浸

益智仁

各四兩

荆三稜

二兩

甘草

三兩

蓬莪朮

六兩

次定方書

善濟方

十七

右為細末一錢入鹽沸湯空心點服

七珍散

出本
事方

治開胃養氣溫脾進食

人參 白朮 黃耆 山芋 茯苓 粟米 炒甘

草

各一
兩

右為末每服三錢水一盞薑棗煎服又方加白扁豆
一兩蒸用名八珍散子製此方溫中不熱每有傷寒
瘡疾中暑得瘧之後用此藥調脾胃日三四服十日
外飲食倍常

安中散 治久遠脾疼反胃吐酸寒邪留滯胸滿攻刺

腹脇嘔逆身倦面黃肌瘦及治婦人血攻刺用

玄胡索

去皮

甘草

十兩炒

良薑

炒

乾薑

炒

桂心

各五兩

牡

蠣

四兩

茴香

五兩炒

右為細末每服二錢酒調下如不飲酒鹽湯點下婦

人淡醋湯下不拘時又治腹內停積不消小腹連腰攻

疰重痛

香朴湯

出百一選方

草葉

厚朴

薑製

白朮

各一錢

陳皮

各二錢

良薑

四錢

草

炙

川薑

炮各一錢

右為粗末每服三錢水一盞薑三片棗二枚同煎至

七分去滓帶熱服不拘時有氣者加木香二錢

七香丸

出百一選方

治嘔逆化積氣消宿食止瀉痢

甘草

剉碎炒

甘藟

去土揀淨

縮砂仁

去土揀淨

丁香皮

薑黃

一用莪朮

益智

各一兩

香附子

擦去皮毛淨二兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服二十九

細嚼白湯下麵糊為丸亦可七香丸極多惟此最真
一方又名小七香丸溫酒薑湯下

治臟氣不足溫養五臟消水穀下氣令人能食

法麴

五兩熬

乾薑

炮

枳實

各五兩炙

附子

三兩炮

人參 甘

草

各二兩炙

蜀椒

一兩炒出汗

右搗篩蜜和丸如桐子大每服十五丸酒飲皆得不
必增之忌猪肉冷水海藻菰菜

人參調中湯

出儒門事親書

調脾胃寬中順氣

沉香

二兩

木香

白芷

一兩
用仁

甘草

一分腦子

一錢麝香

五分人參

五錢

右為末每服五分用沸湯點服或入生薑鹽湯少許

食後服

小橘皮丸

出御藥
院方

調中順氣寬膈進食治心腹痞悶

脹滿飲食遲化嘔噦惡心口苦無味肢體煩倦傳導
不調或秘或泄

橘皮

去白
半斤

木香

縮砂仁

檳榔

各二
兩

青皮

去白
四兩

半夏

六兩湯洗七次

右為細末生薑汁麵糊為丸如桐子大每服六七十丸食後溫生薑湯下

快活丸 治消脾胃順氣進食利小便

丁香

官桂

木香

茴香

各三錢

乾薑

五錢

蒼朮

去皮

炒五錢

右為末醋打麵糊為丸如小豆大每服五七丸食前

好酒送下

秘方思食丸

出醫方集成

神麴

九錢炒

麥蘖

六錢炒

甘草

炙

人參

各二錢

烏梅

去核五錢

右為末煉蜜為丸如鷄頭子大每服十九白湯下一

方無人參

沉香湯

出簡易方

治調中順氣養正除邪理心腹暴痛胃

膈痞滿頭氣煩悶痰逆嘔心飲食少進肢體多倦常服和平臟腑充實肌膚光潤顏色

沉香

二兩

白豆蔻仁

木香

各一錢

甘草

各五錢

生龍腦

一錢麝香 五分
研別研

右為細末入研藥和每服五分沸湯點服或入薑汁
鹽少許亦可酒食後服之甚快又十便治腹脹膨
鼓之有聲喘息不便由上下不升降痞無歸三焦渾
亂用

厚朴 四兩
薑製枳實 三兩
炒桂心 一兩

右粗散每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服名調
中湯又十便治產後泄痢一名調中湯

消酒進食方

生薑

二兩

白朮

五錢

草蓼

一兩

縮砂

二兩

檀香

五錢

炒鹽

五錢

右為細末每服二錢用沸白湯調下

枳實理中丸

出和劑方

理中焦除痞滿逐痰飲止腹痛大

治傷寒結胸欲絕心膈高起實滿作痛手不可近一
方為末調服名枳實理中湯治吐痢後胸痞欲絕心
膈高起急痛手不可近

枳實

一兩
麴炒

白朮

人參

去蘆

甘草

炙

白茯苓

各五錢
去皮

乾薑

各二兩炮

右為細末蜜丸如鷄子黃大每服一丸熟湯化下連

進二三服胃中豁然不拘時

如傷寒湯加枳實根下痢加牡蠣粉各等分

健脾湯 治脾氣不調使人身重如石欲食即嘔四肢

酸削不收

芍藥

甘草

炙黃耆各一兩

生薑

二兩

白蜜

一升

生地黄

一兩

右剉以水九升煮取三升去滓內蜜攪勻調煎令微

沸服八合日三服忌海藻菰菜蕪荑

健脾湯

傳信通
用方

大益脾胃消痰進飲食開通關膈及

酒病尤宜服

生薑

一斤洗過細切入乾磁盆內以鹽四兩
浸一宿日中半曬以鹽汁盡為度用

草豆

薏仁

焙乾

甘草

炙

陳皮

去白

神麴

炒

麥蘖

各二兩
炒勿焦

右為細末白湯點服空心食前

丁香生胃散

御藥
院方

治中焦不和氣滯不下嘔逆惡心

飲食進退肢體困倦常服進美飲食止嘔逆消痰

丁香

藿香葉

肉桂

去粗
皮

薑黃

甘草

各等
分炙

右為細末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去

滓食前溫服

調胃散

宣明論方

治胸膈痞悶不思飲食脇肋硬痛消水脹

半夏

製

甘草

炙厚朴

去皮

陳皮

去白

藿香

已上各

等分

右為末每服一錢薑三片棗二枚水一盞同煎溫服

食前一服無棗煎服

青木香丸

出和劑方

寬中利膈行滯氣消飲食治胸膈噎

塞腰脇脹滿疼痛心下堅痞腸中水聲嘔噦痰逆不

思飲食及治小腸疝氣宜服

葷澄茄

破故紙

各十兩

牽牛末

三十兩一
半炒用

木香

五兩

檳榔

十兩酸陳粟米飯裏檳榔又
用紙裹炭火中煨紙焦去之

右為末和勻米糊丸如菉豆大每服十五丸茶湯熟
水送下如小腸疝氣發作疼痛用蟠葱散煎送下五
十丸通利一二行即愈或用生料五苓散加漢茱萸
灯草三十莖煎水送下不拘時一方食後服每酒食
後可服五丸或七丸小兒一歲一丸妊婦不可服之

理中湯

德生堂方

理中焦不和脾胃中寒胸膈噎塞嘔吐

冷痰噫醋吞酸飲食減少短氣虛羸胸膈滿悶心腹攪痛怠惰嗜卧傷寒時氣內寒外熱上吐下痢心氣結痛手足冷傷胃吐血冷濕氣泄水穀不分腸內虛鳴霍亂之後氣體上虛未禁熱藥者並宜服溫中散逐寒飲去濕固衛止汗

人參 乾薑

炮

白朮

甘草

各一兩炒

右咬咀每服三錢水盞半煎取一中盞去滓空心服

傷胃吐血服如本方過啖熱食迫血上行發為鼻衄
加川芎能理中脘分利陰陽安定血脈用之效 傳

痰留飲加茯苓半夏導利去之 建理傳飲心脾氣

痛加炮過茱萸三十粒 腎氣發動繞臍築痛去木

加桂五錢腎惡燥故去木恐作奔豚故加桂以洩之

小腸氣痛加桂枝川楝子 四肢麻痺加附子天麻

各四分之一 霍亂後傳筋加煨石膏 若誤服附

子中毒者正用本方或只用乾薑甘草等分煎服仍

以黑豆煎湯佐之 寒濕所中昏暈緩弱腰背強急
心腹滿脹胸膈痞塞吐痢交作加附子等分名附子
理中湯定齋於本方中甘草但用四分之一更作細
末每服二錢入燒鹽點服若欲祛氣添入橘皮五錢
名加減理中湯若虛寒洩瀉者加茯苓陳皮等分名
補中湯若溏泄不已補中湯內加附子一兩若水穀
不化食少翻胃更加縮砂五錢名附子理中湯若乾
霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頓服候吐出令透即

進此藥若霍亂吐下心腹作痛手足逆冷於本方中
去朮加熟附名四順湯若渴者加枳實根枳實茯苓
名枳實理中湯若悸多者加茯苓一兩若腹滿者去
白朮加附子一兩若渴欲飲水者添加朮五錢若苦
寒者添加乾薑五錢

理中丸

衛生寶鑑

治溫脾暖胃消痰逐飲順三焦進飲食

辟風寒濕冷之邪亦及大病瘥後胃中有寒涕唾不
止又治婦人新產五內俱虛血脉未定及產後腹痛

作瀉最危急者並宜服之其餘治法理中湯同藥品
在前理中湯正四味是也

右為細末煉蜜為丸每兩作十丸每丸食前沸湯化
服嚼食亦可或作小丸如梧桐子大熱水送下 未

病方云肺寒作嗽加五味子阿膠等分脾肺俱受邪
寒作嗽不止加胡椒八分之一名胡理中丸二方理脾
溫胃散寒止嗽功效特異脾屬土肺屬金土能生金
脾為肺母母能令子實肺受寒而濕理脾氣者此其

意也 治心腹繞痛霍亂轉筋一切沉寒痼冷加附子等分每一丸水煎化服名附子理中湯

黑散子 補益脾胃

青州棗

一斤

生薑

一斤

厚朴

一斤

甘草

一斤

五錢

右剉碎同淹三日慢火炒黑焦置地上出火毒三日為末每服二錢水一盞煎至七分空心服

延年草 邢和璞真人常服安神順氣消酒食益脾胃

老人小兒皆可服昭陵每食後嚼數片神安體健賜

呂申公劉斯立秘之名延年草

上等白鹽花

五兩再淋煎方用須要雪白

新舶上茴香

四兩

甘草

六兩炙

青皮

一斤湯浸三日換水浸苦味去盡然後去穢切作指面大方片子

右用甜水一斗同藥入銀鍋熬不住手攪勿令着底
置密器中收不得走氣候水盡取出慢火炒令乾不
得有焦氣選勤謹者一人專一掌之去甘草茴香不
用只取貯青皮如傷寒生冷及菓實蔬菜之類即嚼
數片氣通即無恙常服一二片極佳以其尤宜老人

邢和璞所以名萬年草斯又以延年目之也

加減平胃散 治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿
刺痛口苦無味胃滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色
萎黃肌體瘦弱怠惰嗜卧體重節痛常多有痢或發
霍亂及五噎八痞膈氣反胃並宜服之常服煖胃消
痰除山嵐瘴氣

蒼朮

揀堅實者剉為兩段以米泔浸一日一換一

宿後以竹刀

刮去皮再浸至濕透盡去油為

度不可致爛再洗
淨焙乾五兩五錢

厚朴

厚者去粗皮剉如小豆大
生薑自然汁浸至浸過三

日人換一者浸五六日炒令去油嚼
之不粘牙為度亦不可焦三兩五錢

粉草

劈片慢

香熟不可
傷火一兩

橘皮

揀真橘皮旋浸旋以瓦磨去白令
盡不可久浸去味焙乾三兩五錢

右為細末每服二錢水一盞入薑二片乾棗二枚同

煎至七分去滓溫服或去薑棗帶熱服空心食前入

鹽一捻沸湯點服亦可一方以棗肉為丸如小豆大

每服五十丸溫生薑湯下空心食前常服調氣煖胃

化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節之氣一方加

人參茯苓如小便赤色加白茯苓澤瀉如水穀不化

飲食多傷加枳實如胸中氣不快心下痞氣加枳實
木香如脾困弱不思飲食加黃耆人參如心下痞悶
腹脹者加厚朴甘草減半如遇夏則加炒黃芩如遇
雨水濕潤時加茯苓澤瀉如遇有痰涎加半夏陳皮
凡加時除蒼朮厚朴外依例加之每一服五錢有痰
用半夏五分如嗽飲食減少脉絃細加當歸黃耆用
服如脉洪大緩加黃芩黃連如大便硬加大黃三錢
芒硝二錢先嚼麩炒桃仁爛以藥送下一方名天下

受拜平胃散一方加草菓名草菓平胃散一名棗肉
平胃散治脾胃不和嘔吐痰水氣刺氣悶脇肋虛脹
腸痛腸鳴胸膈痞滯不進飲食常服溫養脾元平和
胃氣寬中進食並皆治之又選奇方厚朴去皮陳皮
湯浸去白生薑和皮甘草剉各三兩茅山蒼朮去皮
米泔浸一宿剉五兩南京小棗二百枚去核用水五
升煮乾搗作餅子曬乾再焙研為末每服二錢鹽湯
點服泄瀉薑五片烏梅兩箇鹽少許水盞半煎服若

瀉脾濕加茯苓丁香白朮為調胃散一法加藿香半
夏若加乾薑為厚朴湯若溫疫時氣二毒傷寒頭痛
壯熱加連根葱白五寸豉三十粒煎二三服微出
汗即愈若五勞七傷手脚心熱煩燥不安百節酸疼
加柴胡若痰嗽瘧疾加薑製半夏若本臟氣痛加茜
香若水氣腫滿加桑白皮若婦人赤白帶下加黃耆
若酒傷加丁香若飲冷傷食加高良薑若滑腸泄瀉
加肉豆蔻若風痙四肢沉困加荊芥若腿膝冷痛渾

身虛癱拘急加地骨皮若腿膝濕痺加兔絲子若白
痢加吳茱萸若赤痢加黃連若頭風加藁本若轉霍
亂加南木香若七邪六極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重
膝腿酸痛及婦人宮藏久冷月脉不調者加桂若胃
寒嘔吐加生薑一法加茯苓丁香各三兩共成六味
若氣不舒快中脘痞塞加縮砂仁香附子各三兩生
薑煎服若與五苓散相拌為對金飲子若六一散相
合為調胃散若欲進食加神麴麥蘖吳茱萸蜀椒乾

薑為茱萸湯若加薑本為和氣散治傷寒吐痢加半
夏霍香為不換金正氣散若瘧疾寒熱者加柴胡若
小腸氣痛加茴香苦梗一方老人飲食輒噎及痢冷
加吳茱萸生薑煎心怔忡小便不通加水通生薑煎
氣虛胃寒痼冷加附子生薑煎若風熱頭痛加羌活生
薑煎有風頭痛加細辛生薑白朮加乾薑肉豆蔻生
薑煎脾虛發寒熱作瘧加防風草豆蔻煎小兒脾虛
吐瀉發驚加天麻川芎

如稟氣弱入少附
子氣實可不用

婦人小便

白濁

為心胸寒熱不分
加茯苓石菖蒲煎

胃虛咳嗽加五味子生薑胃

虛詭言如見鬼狀身無大熱加防風遠志煎夜夢見
鬼交加龍骨煎肺虛咳嗽加五味子生薑煎有邪熱
發熱吐血加紫苑黃耆煎胃寒大嘔吐加吳茱萸半
夏生薑煎食傷肚脹痛揉之益痛加枳殼一指大生
薑煎有熱甚則欲上高而歌棄衣而走數日不大便
加大黃一錢煎以取利一行

若便自利只
用防風遠志

若陰聞木

音則惕然而驚心欲動獨閉戶而處脉細氣弱不下

飲食忽爾振寒皆胃虛寒所致加附子厚朴各一指

頭大

小兒不用附子
用縮砂生薑煎

久痢不愈者有二一瘦瘠腹脇

滿此為積毒加神麴木香煎其胃虛腸滑瘦瘠不思
飲食臍腹按必有痛加赤石脂肉豆蔻煎人經云按
之有益則為內虛按之無益則為內實一凡腹痛按
之遂止此為有益是虛加赤石脂豆蔻煎一凡腹痛
按之愈痛為無益是內實加神麴木香煎內選一奇
方云諸藥人常服獨此方者透滋味相和而美與衆

方不同故佳

大養脾丸

百一選方

丁香皮

良薑

各一兩

藿香葉

甘草

各一兩五錢

右並生用碾為細末煉蜜為丸如彈子大隨意服之

扶老強中丸

出百一選方

溫煖五臟大健脾胃充肌壯體

通和血脉消食除痰破癥散積寬膨進食化水穀補

中

神麴

炒二兩

吳茱萸

揀淨炒

乾薑

炮各四兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服四五十九不拘時

米飲熱水任下又方加陳皮青皮各二兩麴糊為丸

常服邢醫云加白茯苓四兩尤佳又一方加烏頭剉炒

五兩一方薑湯下一百丸

益中丸

出簡易方

健脾暖胃消化冷痰治中滿脹悶噎氣

吞酸心腹時痛不進飲食

神麴

炒

麥蘖

炒

良薑

炒

陳皮

各一兩

枳殼

去穢麴炒

肉豆

麝

麝裏
煨

丁香

各五
錢

右為細末麵糊丸如梧桐子大每服五十九溫米飲

熱水任下不拘時候

四倍散

和劑
方

治大人小兒脾氣不順補虛進食定吐

白茯苓

去皮
二兩

人參

去蘆
一兩

訶子

煨去核
五錢

白朮

四
兩

右為末每服一錢水一盞薑三片棗二枚煎至六分

空心溫服如早晨常服大妙

厚朴丸

出御藥
院方

和脾煖胃補虛益氣治心腹疼痛胸

膈虛痞腹脹腸鳴口苦吞酸肢體倦怠飲食減少痰
逆惡心時發嘔吐大便不調或即泄瀉

川厚朴

生薑汁製
去皮四兩

乾薑

炮

川椒

去閉口及
目微炒

桂

去粗皮
各二兩

右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸
至五十丸食前溫米飲送下

草豆蔻散

出和
劑方

治脾胃不調胸膈滿悶飲食不化嘔

逆惡心或霍亂嘔吐心腹刺痛腸鳴泄痢水穀不化

草豆蔻

去皮
一斤

生薑

切作片
二斤

甘草

剉八
兩

右件拌勻入於銀器內水浸過三指許以慢火熬令
水盡焙令乾杵為細末每服一錢用沸湯點服不計
時候夏月煎作熱水常服調中吐逆除冷氣消冷食
寬中丸 治氣滯不快飲食不消胸膈痞塞凝痰聚飲
狀如傷寒頭疼脅痞用

大附子

炮去皮剝

青皮

大黃

濕紙裹煨各等分

右為細末醋糊丸如梧桐子大每服十丸薑湯送下

三炒丹

出百一選方

治脾腎

吳茱萸

一兩去枝梗洗淨以破故紙一兩慢火炒候香熟去破故紙

草薢仁

二兩

以船上茴香一兩炒候香熟去茴香

葫蘆芭

一兩以山茱萸一兩炒候香熟去山茱萸

右為細末酒煮麵糊丸如桐子大每服六十九鹽湯下

白朮散

出濟生拔萃方

治四肢懶倦小便不利大便易走沉困

飲食減少

白朮

芍藥

茯苓

各等分

右為末水煎如發熱或惡熱或腹下痛而脉疾黃連為主如未見膿而惡寒乃太陰而傳少陰加黃連為

主桂枝佐之如腹痛甚者加當歸倍芍藥如見白膿
為主如見血黃連為主桂枝當歸佐之

茴香丸

出肘後方

治脾胃進飲食

茴香

二兩味辛平

生薑

二兩味辛微溫惡黃芩黃連天鼠糞

右同搗令勻入淨器用濕紙蓋一宿次入銀石器中
文武火炒令黃焦為末酒丸如梧桐子大每服十丸
至十五丸茶酒下

食藥三稜丸

出百一選方

治脾胃因饑飽不時生病

陳倉米

四兩揀淨以新好色巴豆二十一粒刮去皮慢火同炒候倉米香黃巴豆黑色為度

不令米焦揀去巴豆

橘皮

去白焙乾與倉米等分稱

不用只用陳倉米

右為細末白麵糊丸如黍米大每服三四十丸薑湯

下少入甘草亦可一方治諸般積聚百物所傷陳米

一升數年者已豆一兩去殼同炒令紫色為度去已

豆不用秤炒米四兩入陳皮一兩麝香少許神麴丸

如菜豆大每服二十九薑湯下食後服小兒慢皮風

只五丸甚妙一云食藥用已豆者春冬可服夏秋不

可服易動臟腑一方無已豆製米以薑汁糊為丸米
飲下名太倉丸

指迷寬中丸

吐簡
易方

治脾胃不和冷氣客於中則氣收

聚而壅遏不通是為脹滿

橘皮

四兩
白朮二兩

右為細末酒糊丸如桐子大食前木香湯下三十丸

治脾強胃弱

用升麻湯加黃連厚朴

二橘散 養脾胃進飲食

青橘皮

湯浸去白焙

陳橘皮

湯浸去白焙各二兩

益智

去皮微炒

藁香

子炒荆三稜

煨研

木香

肉豆蔻仁

各三分

縮砂仁

去人參

各一兩

薑黃

甘草

各五錢炙剉

右搗羅為散每服二錢匕入鹽少許沸湯點服空心

食前

奪命抽刀散

出仁存方

治男子婦人脾胃積冷中焦不和

心下虛痞腹中疼痛胸膈逆滿噎塞不通嘔吐冷痰

飲食不下噫氣吞酸口苦無味不思飲食婦人久病
血氣刺痛不可忍者男子或當空露外或受風露之
邪得心痛積年大効

乾薑

剉入巴豆五錢同炒
至黑色即去巴豆

良薑

入斑毛一百箇同
炒即去斑毛各二

十兩糯米

二十五兩炒

石菖蒲

不見火二
十二兩

右為細末每服二錢用鹽少許沸湯點服不拘時常
服醒脾胃進飲食此藥大解酒毒空心食前服或溫
酒調尤佳一方以去殼巴豆炒蛤粉去巴豆入內煎服

若尋常氣痛不用已豆炒只加炒蛤粉亦得或甚而
心腹痛大便秘者已豆同粉研爛同油刀散醋糊丸
服二三粒大腑通為度

守中金丸

出和
劑方

理中焦不和脾胃積冷心下虛痞腹

中疼痛或飲酒過多胸脇逆滿噎塞不思飲食又治
傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐痢心腹繞痛手足不和
身熱不渴腸鳴自利米穀不化及咳嗽無時嘔吐冷
痰飲食不下噫醋吞酸口苦無味怠惰嗜卧

乾薑

炮

甘草

炙

蒼朮

米泔

桔梗

去

蘆

右各等分煉蜜為丸如彈子大每服一九食前沸湯
嚙下又治脾胃留濕體重節痛面色萎黃肌肉消瘦
常服溫脾煖胃消痰逐飲順三焦進美飲食辟風寒
濕冷

五味湯

出類
鈴方

溫中益氣治胸膈痞滿心腹刺痛短氣

噎悶咳嗽痰唾嘔逆惡心不思飲食

五味子

洗九
斤

良薑

炒

陳皮

去
白

茴香

炒一
斤

甘草

炒七
十斤

半
鹽 炒一十
二斤

右為細末每服二錢沸湯點服

過脾湯

出類
鈴方

治脾胃不和宿醒留滯嘔吐酸水心腹

脹痛不思飲食傷冷洩瀉

麻油

四兩

良薑

十五兩

茴香

炒十兩

甘草

十一兩
七錢

右炒鹽一斤同藥炒為細末每服一錢白湯下常服

快氣大解中酒進美飲食

秦綾錦家二十四味養脾丸

傳信適
用方

治風冷寒濕邪

氣腹脹痞滿刺痛腸鳴泄瀉吐逆吞酸羸弱困怠無力不思飲食一切脾胃之疾並治之

丁香 陳香

木香

各一錢五分

附子

六錢五分 炮去皮臍秤

陳

皮

去白五錢

大腹皮

神麴

炒各五錢

白朮

大麥蘖

炒肉

桂

去皮不見火各一兩五錢

厚朴

去皮薑汁製三兩

訶子

炮去核一兩三錢

人

參

去蘆各四錢

縮砂仁

八錢

革澄茄

白附子

炮高

良薑

油炒

紅豆

去紅皮

胡椒

炒

甘草

炙

川薑

炮各二錢

生薑

十四兩切
作片焙乾

調和胃氣

本草

以乾薑去皮於鐺鍋中微火緩逼乾為末量多少入生薑末為湯點

凡遇處暑節暑猶未退宜微收實毛皮益衛氣秋以胃氣為本藥中加時藥使邪氣不能傷也以益元氣調胃主之

人參

三分

益氣和平

當歸身

三分

和血潤燥

陳皮

去白

順氣和平

熟地黃

三分

養血瀉陰火

三兩

佐

潤燥

白芍藥

臣四分

大補脾胃微收治風木之邪

升麻

三分使

使陽明之氣上升以滋榮百脉

柴胡

二分使

引少陽之氣出於胃中使風行於地之上

黃芪

臣五分

實皮毛止自汗益元氣

半夏

湯洗三分佐

療風痰胃氣進食麥門冬

去心三分佐

猶有暑氣未

退安肺氣得秋分不用

白朮

二分佐

養胃氣厚腸

胃和中炙甘草

二分

調和胃氣溫中益氣

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去滓溫服忌食

辛熱之物及助暑氣秋氣不能收也正氣得復而安矣

厚朴丸

出十便良方

治脾虛受濕濕勝則濡泄故腸鳴夜

起四肢浮腫困怠少力

厚朴

一斤

生薑

半斤淨洗切作片

附子

七分者四枚

大棗

五十枚

人

參

訶子

白朮

白茯苓

肉豆蔻

木香

以上

六味各

二兩

右將前四味入銀石器中以水一斗慢火熬乾取棗

去皮核四物一處搗如泥將人參等六味作細末和勻入少麵糊同搜和杵千下丸如桐子大每服五十丸米飲送下食前

木麴丸

出十便良方

進飲食快中脘

神麴

四兩

大麥蘖

二兩

橘紅

白朮

各一兩

白豆蔻

五錢

右為細末浸蒸餅心為丸如桐子大每服三五十丸不拘時候濃煎人參湯下日進三四服

健脾人參丸

出十便良方

治脾胃久虛飲食全減

鍾乳粉

二兩

人參

石斛

各三分

大麥蘖

乾薑

陳

橘皮

各五錢

右為細末水煮麵糊為丸如桐子大每服二十九空

心米飲下

厚朴煎

出十便良方

治脾胃虛冷腹脇刺痛飲食進退大

便秘

厚朴

四兩

陳皮

三兩

乾薑

二兩

附子

一兩

右為細末棗肉和丸如桐子大每服三十丸空心米

飲下

厚朴煎丸

出十便良方

補脾健胃強中逐寒大去冷痰魚

止吐瀉倍進飲食

厚朴

一斤紫黑者去粗皮剉如指面大以生薑半斤和皮切作片子水三升慢火熬乾去薑不

用乾薑

四兩

附子

炮去皮臍二兩

方為細末生薑煮棗肉丸如桐子大每服三十丸至

五十九丸空心米飲下

六君子湯

出十便良方

治胸膈痞悶脾寒不嗜食服燥藥

不得者正宜服此

甘草 陳橘皮 白朮 人參 白茯苓 半夏

各等分

右各等分為粗末每服五錢以水二盞加生薑五片同煎至一盞去滓溫服不計時候

丁香平胃散

出十便良方

理一切氣溫 and 脾胃大進飲食

止腹痛療泄瀉

厚朴 白朮

各六兩

甘草 陳橘皮

各二兩五錢

縮砂仁

丁香

各二兩

右件為細末每服三錢水一盞生薑七片棗三枚同

煎八分溫服食前

胃愛散

出十便良方

治脾久虛中焦氣滯上壅或有冷痰

上潮嘔惡或有胸腹疼痛不思飲食

丁香

一分人參

一分白朮

茯苓

甘草

各一分

肉豆蔻

三錢乾薑

各五錢

黃耆

一錢

右白米二盞同碾為細末每服二錢水一盞入生薑

一片同煎至七分通口服如臟腑不調加丁香十四粒石蓮心七粒同煎七分通口服溫服空心食前

厚朴煎丸

醫方大成

溫中下氣理脾進食常云補腎不若

補脾然胃既伏則飲食進飲食既進榮衛血氣自盛矣

厚朴

一斤極厚者去皮剉如指面大用生薑二斤不去皮淨洗切片用水五升同煮水盡去薑

只焙乾

乾薑

舶上茴香

各四兩

附子

二兩炮去皮臍

甘草

厚朴

剉半寸長二兩二味再用水五升同焙厚朴處煮水盡不用甘草只將乾薑厚朴焙乾

右同為末生薑煮棗肉丸如桐子大每服五十丸米

飲下

厚朴丸

治風經
驗方

治脾胃氣弱胸中滯悶痰飲不思飲

食或大便不調

厚朴

去粗皮塗薑汁
炙香焦一兩

木香

一陳橘皮
去穢焙
一兩

檳榔

四箇肉豆蔻仁

四箇

右為末別用神麴一兩杵碎炒熟為細末以生薑自然汁調煎作糊丸如梧桐子大每服二十九至三十丸生薑湯下稍空服

紫蘇散

王氏博濟方

治肝氣盛行於脾胃致多飧泄調順

中脘平和胃氣

紫蘇葉

一分揀擇淨控乾

紫花白朮

五錢細剉微炒黃色

肉豆蔻

一分

去殼青橘

去白一分

蠻薑

半份

縮砂仁

一分

芎藭

一分

以鹽一分同炒令黃色佳

右件九味同為細末每服二錢水一盞入生薑三片

同煎至五分溫服日進三服

白豆蔻散

王氏博濟方

補中益氣調順脾元心胸滿悶不

思飲食上熱下冷宜服

白豆蔻仁

錢五

肉豆蔻仁

三箇

肉桂

去皮五錢

白朮

一兩

青橘

皮

去穢五錢

甘草

三分炙

厚朴

去皮薑汁炙五錢

右件七味同為細末每服三錢水一盞入生薑二片

粟米少許棗三枚同煎至七分去滓熱服之

人參訶子散

王氏博濟方

和胃氣進飲食

草豆蔻

二枚煨

甘草

五錢炮

茯苓

五錢

人參

一分訶子二枚炮

陳皮

去白五錢

蒼朮

一分炙

右同為末每服二錢入煨生薑二塊水一盞煎至七

分溫服

桂附丸

衛生家寶方

治脾胃進飲食

香附子 厚朴 陳皮 甘草 蒼朮 桂心

三稜 肉豆蔻

一箇煨

阿魏

各五錢別研

右為末酒糊為丸如龍眼大每服一丸生薑一塊切開作孔安藥在內合定濕紙裏煨後熱鹽湯嚼下

煮朴丸

衛生家寶方

補氣化痰溫脾進食

好厚朴

去皮取
四兩

附子

三兩去皮生
用切作片

陳皮

二兩不
去白

川

乾薑

一兩
判

青州棗

取肉
半斤

右件入鍋內用水浸過二指煮盡為度慢火炒乾不
得令焦入

舶上茴香

一兩
炒

白朮

一兩

白茯苓

一兩

神麴

二兩炒
別為末

右一處為末用神麴為丸如桐子大空心食前下一
百丸米飲吞下

平胃煮散

衛生家
寶方

寬中利膈消酒進食快脾胃止嘔

逆霍亂吐瀉辟四時惡氣時氣嵐瘴諸病或酒食後尤宜進之此藥療疾有異効不可盡述

蒼朮

四兩洗淨剉細作片子先以米泔浸一宿了流出復用清水浸一宿流出焙乾或曬乾用

白朮

二兩橘皮去白取二兩

棗

四兩剉碎

厚朴

去粗皮取四兩先以生薑自然

汁浸一宿火上炙令香剉細

生薑

四兩切作片

甘草

二兩剉作半寸許

右件依數修合事了以磁鍋或鉢或餅入藥在內以水淹浸二三寸許文武火煮乃不緊不慢火候煮藥同乾將出火焙燥碾羅為細末每服二錢水一盞入

生薑二片棗一枚同煎至八分服白水煎亦可或沸湯點服並宜早晨空心常進一服

九寶湯

衛生家寶方

和中化痰快脾胃用真厚朴去粗皮

秤三兩半夏三兩沸湯炮九次切成片焙乾作粗末二味共六兩和作一處用生薑十二兩淨洗和粗皮搗令細同厚朴半夏浸一宿日曝乾却入後藥

甘草

炙

桔梗

一兩去蘆酒浸切碎炒令黃色

藿香

三兩

陳皮

三兩

人參

一兩紫蘇葉

三兩

右為粗末每服三錢水一盞入紫蘇十葉煎至六分
去滓不拘時候服

正脾散

衛生家
寶方

調脾養胃順氣治倦怠腹痛進飲食

此藥大治酒後數便如痢氣瀉脾疼等疾不可盡述
凡嶺外瘴癘若能空腹一服永無所苦

緊實大蒼朮

一斤米泔浸一宿
去皮薄切焙乾秤

粉草

二兩

南木香

一兩

不見火

桂心

一兩去粗
皮不見火

吳白芷

一兩

粉薑

一兩

益智仁

一兩

陳橘皮

二兩
去穢

荆南茴香

一兩

右為細末每服一錢水一盞紫蘇二葉或棗子一箇
同煎至七分入鹽少許通口喫食前日三服如大便
壅秘則食後時以青木香丸服得臟腑氣快為妙

健脾丸

經効濟世方

溫煖脾胃增進飲食

厚朴

一斤去皮切

棗

二斤去核切

生薑

一斤去皮切

右三味先入鍋內猛火炒勻攪候紫焦傾出為粗末
每末一斤入良薑四兩乾薑四兩炮製神麴四兩同
為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五十丸空心

米飲送下加附子二兩炮去皮臍

和中丸

出濟生
板華方

補脾胃進飲食

乾生薑

橘皮

人參

各一錢

乾木瓜

二錢
炙

甘草

二錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大溫水送下

調脾散

續易
簡方

治脾胃少有不和可常服

蒼朮

米泔水浸一宿冬月則浸二
宿焙乾炒令赤色秤八兩

厚朴

去皮五兩
薑汁炒

甘草

一兩
炙

右為細末每服二錢用燒鹽湯點七分溫服或用水

一盞薑三片棗二枚煎七分食前服或作丸散

溫脾煖胃散

廣南四時
橘生論

陳橘皮 白朮 厚朴

各一兩

右為散每服一大錢水一盞入薑棗同煎至七分空

心溫服

沉香養脾丸

華陀中
藏經方

人參 白朮 川麴薑 炮 甘草 炙 丁香 木香

肉豆蔻

麴裏
煨

縮砂

八味各
五錢

沉香

一分

右為末煉蜜丸一兩作十粒每服一粒食前嚼下化下亦得

枇杷葉散

朱氏集驗方

調理脾胃清膈下氣去積滯舒氣

除痰推陳納新養生之要也不可缺也

丁香

乾薑

半夏

湯浸洗

沉香

枇杷葉

薑汁塗炙

肉

豆蔻

各三錢麪裹煨

甘草

各五錢五分

白豆蔻仁

炒

陳皮

縮

砂仁

炒各六錢

茯苓

去木

白朮

各一兩

檳榔

二錢五分煨

青皮

四錢

五木香

四分錢

右呖咀每服三錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至七分不拘時候

運脾散

十便良方

縮砂 吳朮 人參 藿香 肉果 丁香 神

麴

各一兩

甘草

五錢

右件為細末服時以橘皮湯點之通中健胃消食

中和湯

十便良方

調適陰陽通流榮衛養脾進胃快飲食

治脇肋脹滿止嘔逆惡心

白朮

兩四

黃橘皮

厚朴

人參

甘草

茯苓

各二

兩五

錢

右為細末每服二錢水一盞入生薑三片煎至七分

去滓食前溫服

安胃丸

衛生寶鑑方

治寒邪傷胃溫中補氣安胃進食

縮砂

錢二

陳皮

錢三

木香

錢一

白朮

錢五

青皮

錢二

白茯苓

錢二

乾薑

三錢炮

大麥蘖

五錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服三十九丸溫

水送下食後忌冷物

補中丸

衛生寶鑑方

補脾虛調胃進飲食止瀉痢定痛

厚朴

一兩

乾薑

五錢

白茯苓

一兩

陳皮

一兩

甘草

一兩

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服一丸空心食前

白湯化下嚼亦可

沉香湯

楊氏家藏方

溫脾快膈進飲食除嘔逆

沉香

五錢

甘草

五錢

檀香

三錢

白豆蔻

三兩

縮砂仁

六分

木香

三分

麝香

半字

另研

右件為細末入麝香研勻每服一錢入鹽少許沸湯點服

進食散

朱氏集驗方

調胃進食療腹脹吐逆

青皮 陳皮 甘草 肉桂 附子炮 草葉子

訶子 良薑 白薑

右等分咬咀生薑三片棗子一枚水一盞半煎至一

盞空心一日三服

厚朴煎丸

說說方

凡補脾胃進飲食滋榮衛固精血孫

兆云補腎不如補脾胃蓋脾能運化飲食也

茴香

炒黃川椒

炒少時各四兩

附子

炮益智仁

各二兩

厚朴

半斤

去皮剉如指面大用生薑半斤帶生薑

切作片子用水三升慢火煮乾去薑

乾薑

四兩研如

散大用甘草二兩剉半寸長

用水五升同煮焙乾去甘草

右為末用生薑煮肥棗約一斤去皮取肉和丸如桐

子大每服五十丸空心米飲下此藥溫中升降氣血

進飲食化痰涎極有神効人能常服此藥久則補助

脾氣無白濁白淫之症自然無病丈夫婦人皆可服

拾珍散

出簡易方

治大病之後氣不復常乏力短氣精神

不足口苦無味

揀參 白朮

白茯苓

黃耆

蜜炙

白扁豆

薑製

山藥

各一兩

縮砂仁

桔梗

五味子

甘草

各五分炙

右為細末每服三錢水一盞薑三片棗二枚煎至七

分食前服之

助氣益脾胃

用鵲嘲烏一枚煮炙食之頓盡一枚至驗

鵲嘲似雀尾短黃色

在深林間飛翔不遠一名
鵲鳩一名鳴鳩或呼為鵲

硃砂丸

以硃砂不計多少用罐子內著硃砂上面更座罐子
一箇用紙筋白土和上下俱泥了窖乾後從辰初時
便用蒼耳草自在落下葉將來搗羅為末藥上鋪頭
蓋紙上面罐子內用水坐著水旋添火燒從罐子外
五寸已來圍遶欲盡更添火移向前罐子周圍火盡
更促向前計一伏時為度更不移火即閒雜人及婦

人不得見一伏時住取來搗羅為末醋煮麵糊為丸
如梧桐子大每服逐日十九至十五丸溫酒或米飲
下並無忌若熟燒喫二三斤進食無病

脾胃俱實

附論

夫右手關上脉陰陽實者足太陰與陽明經俱實也病
苦脾脹腹堅搶脇下痛胃氣不轉大便難時反泄痢腹
痛上衝肺肝動五臟立喘鳴多驚身熱汗不出喉痺精
少名曰脾胃俱實者也

方

瀉熱方

出千金方

大黃 麻黃 黃芩 杏仁 赤茯苓 甘草

各四兩

橘皮 芒硝 澤瀉

各三兩

右㕮咀水九升煮三升絞去滓內大黃煮兩沸去滓

下芒硝分三服

大黃瀉熱湯

出千金方

治脾脉厥逆大腹中熱切痛舌強

腹脹身重不下心注急痛

大黃

細切水一升
半別漬一宿

甘草

各三兩

澤瀉

茯苓

黃芩

細辛

芒硝

各二兩

橘皮

二兩

右㕮咀以水七升煮三升三合去滓下大黃更煎兩

沸去滓下芒硝分三服

瀉黃散

出危氏方

治脾胃壅實口内生瘡煩悶多渴頰痛

心煩唇口乾燥壅滯不食

藿香葉

七錢

石膏

煨

縮砂仁

山梔子

各五錢

甘草

各五

錢防風

去蘆四兩

右剉同蜜酒炒香焙為末每服三錢水一盞煎至七分服不拘時候

普濟方卷二十二